

## Glossar: Erweitern

### Erweitern [Grundlagen, Bruchrechnung]

Umformung eines [Bruchs](#) durch Multiplikation seines [Nenners](#) und seines [Zählers](#) mit derselben Wert (ungleich 0).  
Dadurch wird der Wert des Bruchs nicht geändert.

**Bem.:** Es handelt sich um die Gegenoperation zum [Kürzen](#).  
Mathematisch ausgedrückt sieht das Erweitern des Bruchs  $\frac{z}{n}$

mit der Zahl  $c \neq 0$  so aus:  $\frac{z}{n} = \frac{c \cdot z}{c \cdot n}$

**Bsp. 1:** Erweitern des Bruchs  $\frac{3}{4}$  mit 2 ergibt  $\frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$

**Anwendungen:** Wichtigste Anwendung ist das gleichnamig-Machen von Brüchen, um sie zu addieren (oder zu subtrahieren).

**Bsp. 2:**  $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{6}{8} + \frac{1}{8} = \frac{6+1}{8} = \frac{7}{8}$ .

Dabei ist es sinnvoll, auf den kleinsten gemeinsamen Vielfachen ([kgV](#)) zu erweitern.  
(Siehe: [Bruchrechnung](#))

**Übertragung auf Terme:** Auch [Terme](#) in Bruchform kann man erweitern.

**Achtung:** Dabei wirkt der Bruchstrich wie eine Klammer.

**Bsp. 2:** Erweitern des Bruchs  $\frac{x+3}{2}$  mit 5 ergibt

$$\frac{5 \cdot (x+3)}{5 \cdot 2} = \frac{5 \cdot x + 15}{10}$$

**Achtung:** Erweitert man mit einem Term, der den Wert Null annehmen kann, so kann sich das auf die [Definitionsmenge](#) des Bruchterms auswirken.

**Bsp. 3:** Der Bruch  $\frac{x+3}{x-4}$  ist definiert für alle  $x \neq 4$ . Erweitern mit



$(x + 2)$  ergibt:  $\frac{(x+2)(x+3)}{(x+2)(x-4)} = \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 2x - 8}$ , dieser Ausdruck ist aber nur für alle  $x$  außer 4 und  $-2$  definiert.

**Link** mit Übung:

<http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/erweitern/brucherweite rn.html>

